

シダキュア スギ花粉舌下錠

ミティキュア ダニ舌下錠

かく にん
確認チェックシート

治療に関すること

- 長期間の治療を継続いただけますか。
- 少なくとも1か月に1度、定期的に受診いただけますか。
- 治療を終了、中断する際には医師に相談することを理解いただけましたか。

服用に関すること

- 服用手順(舌の下に1分間保持、服用後5分間はうがい・飲食を避ける)を理解いただけましたか。
- 最初の1週間、2週目以降の服用及び服用スケジュール、服用を誤った場合の対処法を理解いただけましたか。
- 服用前、及び服用後2時間は、激しい運動、アルコール摂取、入浴などをしないこと、服用後2時間以降にこれらを行う場合にもアナフィラキシー等の副作用の発現に注意することを理解いただけましたか。
- 医師に相談する事項(体調が悪いとき、口の中に異常があるときなど)を理解いただけましたか。
- 開封時の注意(乾いた指で取り出すことなど)や
取扱い時の注意(他の人に使用させないなど)について理解いただけましたか。

副作用に関すること

- 次のような副作用がおこる可能性があることを理解いただけましたか。
- 【主な副作用】**
・口の中の腫脹、かゆみ、不快感、違和感 ・口内炎 ・唇の腫れ ・喉の刺激感、かゆみ、不快感、違和感 ・耳のかゆみ など
- 【重大な副作用】**
・ショック、アナフィラキシー
- 服用後少なくとも30分間、服用開始初期は副作用の発現に特に注意することを理解いただけましたか。
※シダキュアの場合には、スギ花粉が飛散している時期にも注意が必要です。
- アナフィラキシーとその早期にみられる症状について理解いただけましたか。
- 副作用(特にアナフィラキシーで早期にみられる症状)が現れた場合の対処法(医療機関に受診するなど)を理解いただけましたか。

上記内容について説明を受け、理解しました。

年 月 日

お名前

保護者のお名前